




知っておくべきポイント！



1mの高さから嘔吐した場合、
半径2mかつ高さ1.6mまで
消毒する必要があります。



立ち入り禁止


感染拡大を防ぐため
同じ部屋に人がいる場合は
速やかに別室へ誘導してください。



嘔吐物処理の手順



換気をする。




※上から見えます。

防護具を着用し、嘔吐物にペーパータオルを被せる。外側から内側の順に嘔吐物が隠れるように乗せていく。




次亜塩素酸ナトリウム溶液を上からかける。




外側から内側に向かって嘔吐物やペーパータオルを回収し、ビニール袋に入れる。




汚染されているビニール袋の中に次亜塩素酸ナトリウム溶液をかけ、袋を閉じる。



清潔区域のビニール袋に汚染したビニール袋を入れ閉じる。




半径2m範囲内にペーパータオルを敷き詰める。




ペーパータオルの上から次亜塩素酸ナトリウム溶液をかけ、10分待つ。



10分経過を待つ間に防護具を全て脱ぎビニール袋に捨て、手袋は新しい物に交換する。



10分後、外から内側に向かってペーパータオルを回収。ビニール袋に入れる。



最後にぞうきんで床全体を水拭きする。

Finish!

清潔



処理が終わったら
しっかり手洗い&
洋服を着替える
のを忘れずに！

台東保健所 保健予防課 感染症対策担当

☎03(3847)9476